

# Estudio de farmacovigilancia activa al PrevengHo-Vir. Municipio Cerro

Autores: Mayasil Morales Pérez<sup>1</sup>, Johann Perdomo Delgado<sup>2</sup>, Kirenia Cisneros Mendoza<sup>3</sup>, Idalmis Céspedes Martínez<sup>1</sup>, Lérica Acosta de la Luz<sup>1</sup>, Milagros García Mesa<sup>1</sup>, Adrian Saborit Rodríguez<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Laboratorio Central de Farmacología <sup>2</sup>Departamento Nacional de MNT <sup>3</sup>DMS Cerro <sup>4</sup>Facultad de Ciencias Médicas "Salvador Allende"

## INTRODUCCIÓN

Los compuestos homeopáticos, a pesar de las críticas que los rodean, han demostrado sus efectos tanto en estudios experimentales como clínicos. El principio general de este tratamiento es buscar la relación de semejanza entre el medicamento y la enfermedad para que tenga lugar la curación. Las reacciones adversas a estos productos es un tema poco tratado, debido sobre todo a la enorme controversia que existe a su alrededor. A pesar de la seguridad con la cual se promocionan, no están libres de riesgos. Las reacciones adversas asociadas a su uso se denominan reacciones adversas homeopáticas.

## OBJETIVO

Identificar y caracterizar las reacciones adversas asociadas al uso de PrevengHo-Vir en áreas de salud del municipio Cerro.


Este tipo de estudio lleva implícitas ciertas limitaciones dentro de las cuales se encuentran:

El sesgo de subregistro ya que los pacientes pueden ocultar las reacciones adversas por miedo a ser considerados sospechosos de presentar COVID-19.

La cantidad de trabajo existente en la APS debido a la pandemia de SARS-CoV-2.

La interpretación de los datos de farmacovigilancia puede ser difícil.


## MÉTODOS



Se realizó búsqueda activa de sospechas de reacciones adversas en el total de la población expuesta al medicamento homeopático.


## RESULTADOS

Gráfico 1. Reacciones adversas por PrevengHo-Vir según sexo y grupos de edad



Fuente: notificación de sospechas de reacciones adversas

Gráfico 2. Reacciones adversas por PrevengHo-Vir según causalidad y severidad



Fuente: notificación de sospechas de reacciones adversas

Tabla 2. Reacción adversa principal

RAM	Cantidad	%
Cefalea	15	33.3
Diarreas	7	15.5
Estornudos	4	8.8
Dolor abdominal	4	8.8
Mareos	4	8.8
Tos	3	6.6
Dolor de garganta	2	4.4
Rash	1	2.2
Decaimiento	1	2.2
Dolor muscular	1	2.2
Edema del labio superior	1	2.2
Hipotensión arterial	1	2.2
Prurito	1	2.2
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100.0</b>

Fuente: notificación de sospechas de reacciones adversas

DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA  
TODAS LAS REACCIONES ADVERSAS  
ENCONTRADAS SON NO DESCRITAS

## CONCLUSIONES

La RAM más notificada fue la cefalea seguida por las diarreas. La caracterización de las reacciones adversas encontradas mostró fueron leves, definitivas y no descritas en la literatura.